

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください－

## 使用上の注意改訂（クロルヘキシジン塩酸塩含有製品）のお知らせ

2017年10月

発売元：京都薬品ヘルスケア株式会社

製造販売元：京都薬品工業株式会社

このたび、弊社クロルヘキシジン塩酸塩含有製品（「マードレトローチ」、「フェロップストローチ」）の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日時を要します。

製品のご販売に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容にご留意いただきお客様へご説明いただきますようお願い申し上げます。

### 1. 使用上の注意 改訂内容（下線部：追記箇所）

#### ■してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

#### 1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### ■相談すること

（中略）

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の相談を受けてください。

症状の名称	症 状
<u>ショック</u> <u>（アナフィラキシー）</u>	<u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。</u>

### 2. 改訂理由

平成29年10月17日付け薬生安発1017第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知による。

### 3. 該当製品

弊社が販売するクロルヘキシジン塩酸塩含有製品一覧

	該当製品	製造販売元
口腔咽喉薬	マードレトローチ	京都薬品工業(株)
	フェロップストローチ	

### 4. その他

使用上の注意改訂に伴い、外部の容器の〔注意〕欄にも追記を行いました。

以上