



## お客様各位

### 使用上の注意改訂（ジヒドロコデインリン酸塩）のお知らせ

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「ジヒドロコデインリン酸塩」を含有する製剤（かぜ薬、鎮咳去痰薬）の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ここにお知らせ致します。

順次改訂作業を進めておりますが、在庫等の関係上、改訂された製品がお手元に届くまでには、時間を要するものと予想されます。

つきましては、改訂内容をご案内させていただきますので、今後の販売・服用の際にご参照いただくよう、お願いいたします。

#### ・改訂内容

#### かぜ薬・鎮咳去痰薬

#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

次の診断を受けた人

呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

#### 【用法及び用量に関連する注意】

##### ・12歳未満の用法及び用量がある場合

12歳未満の小児には、医師の診断を受けさせることを優先すること。

##### ・7歳未満の用法及び用量の場合

7歳未満の小児には、医師の診断を受けさせることを優先すること。

※下線部が追加されます

#### ・改訂理由

平成29年7月4日付 薬生安発 0704 第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知による。



・対象品目

かぜ薬（1品目）	
総合かぜ薬N I D顆粒	

鎮咳去痰薬（3品目）	
ビスティーせき止め顆粒N	ビスティーせき止め顆粒
ビスティーせき止め液	